



Ce.Le.Ma.Sche

centrale di lettura delle malattie scheletriche del cane

VIA GIUSEPPE FABBRI 168 - 44124 FERRARA

TEL 0532.1858063

E-MAIL: segreteria@celemasche.it

WEB: http://www.celemasche.it

Formulario per la ricerca della displasia dell'anca

N. ROI/RSR 18139687

Giudizio della Posizione:

Table for limb position: simmetrico, asimmetrico, arti distesi, ben disteso, ben ruotato

Data esecuzione 19/02/2024

Table for limb position: D | S, Incerto

Giudizio dell'Esecuzione: ben leggibile, poco leggibile, incerto

ANESTESIA / SEDAZIONE

Farmaco/i MEDETOMIDINA - PROPOFOL, Dosaggio per Kg p.v. 0.05 mg/Kg - 4 mg/Kg

OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO:

RISERVATO ALLA CENTRALE DI LETTURA DISPLASIA

METODO DI VALUTAZIONE ANGLOSASSONE

FOSSA ACETABOLARE (F.A.) 0 Normale + Incisura acetabolare uniforme, 1 Aumento densità ossea medialmente, 2 F.A. e M.A.V. indistinti, 3 Incisura acetabolare irregolare, 4 Parte mediale spostata lateralmente alla F.A. / M.A.V. non visibile, 5 F.A. nascosta da tessuto neoformato, 6 Nuova superficie articolare laterale alla F.A.

MARGINE ACETABOLARE CRANIALE (M.A.C.) 0 Uniformemente curvo, parallelo alla T.F., 1 Appiattito nel quarto laterale, 2 Completamente appiattito, 3 Appiattito + bilabiazione, 4 Appiattito + moderata bilabiazione, 5 Appiattito + evidente bilabiazione, 6 Intero margine inclinato cranialmente

MARGINE ACETABOLARE DORSALE (M.A.D.) 0 Curva a S, 1 Perdita curvatura, 2 Esostosi piccole craniali, 3 Esostosi evidenti craniali, 4 Esostosi laterali, 5 Esostosi lungo tutto il M.A.D., 6 Massive esostosi

MARGINE ACETABOLARE CAUDALE (M.A.Ca.) 0 Linea nitida, 1 Piccole esostosi laterali, 2 Piccole esostosi laterali e mediali, 3 Esostosi grandi / riduzione incisura acetabolare, 4 Esostosi marcate / «uncino» della parte laterale, 5 Marcata distorsione per neoformazione ossea / scomparsa incis. acetabolare

RIMODELLAMENTO DELLA TESTA DEL FEMORE 0 Normale, 1 T.F. non tonda per esostosi e perdita ossea, 2 Perdita ossea e/o esostosi ad «anello» (medusa), 3 Evidente perdita ossea + esostosi aspetto conico T.F., 4 Rimodellamento testa a «fungo», 5 Rimodellamento marcato + grossa neoformazione ossea, 6 T.F. mal conformata

SUBLUSSAZIONE 0 T.F. ben contenuta nell'Acetabolo, 1 Centro T.F. mediale al M.A.D., 2 Centro T.F. sovrapposta al M.A.D., 3 Centro T.F. appena laterale al M.A.D., 4 Centro T.F. laterale al M.A.D., 5 Centro T.F. completamente laterale al M.A.D., 6 Dislocazione patologica

TESTA FEMORALE E COLLO (T.F. e C.) 0 Profilo liscio e tondo, 1 Piccole esostosi ad «anello» (medusa), 2 Esostosi sul profilo e/o densità parte mediale collo, 3 Marcate esostosi ad «anello», 4 Evidente completo collare di esostosi, 5 Massive esostosi aspetto a «fungo», 6 Esostosi imponenti riempiono la fossa trocanterica e la zona al di sotto la T.F.

BORDO ACETABOLARE CRANIALE EFFETTIVO (B.A.Cr.E.) 0 Giunzione netta, 1 Esostosi molto piccole, 2 Appiattimento e/o esostosi e/o accennata bilabiazione, 3 Esostosi e/o bilabiazione, 4 Evidenti sfaccettature e/o esostosi e/o bilabiazione, 5 Esostosi e bilabiazione molto marcate, 6 Completo rimodellamento del B.A.Cr.E. + esostosi

ANGOLO DI NORBERG >=15 0, +10° -> +14° 1, +5° -> +9° 2, 0° -> +4° 3, -1° -> -5° 4, -6° -> -10° 5, <11° 6

METODO DI VALUTAZIONE STANDARD

Table for acetabular cavity: Giudizio della Cavità Acetabolare, Impresione generale, orlo anteriore della cavità, contorno della cavità

Table for femoral head: Giudizio della Testa del Femore, Impresione generale, posizione della testa

Table for femoral neck: Giudizio del Collo del Femore, snello, spesso, nettamente disegnato

Table for rim: Giudizio della Rima dell'Articolazione, limitata concentricamente, aderente

Table for observations: Ulteriori osservazioni: Misurazione secondo Norberg, angolo uguale o maggiore di 105°, minore di 105°

Osservazioni

Timbro del Veterinario

AMBULATORIO VETERINARIO Dott.ssa Gozzanelli Alice Via G. Di Vittorio 42044 Qualterzette Cell. 349 617 8537 - Tel. 0522 828771

Verificata l'identità del cane

Giudizio del veterinario:

- A - nessun accenno di displasia dell'anca, B - sospetta displasia dell'anca, C - leggera displasia dell'anca, D - media displasia dell'anca, E - grave displasia dell'anca

Table for veterinarian judgment: A-E

Referto CeLeMaSche

- A - normale, B - quasi normale, C - ancora ammesso, D - media displasia, E - grave displasia

Osservazioni:

Per CeLeMaSche (Il Responsabile)

- Asnaghi dr. Ferdinando, Pedrini dr. Giuliano, Piccinini dr. Paolo

Data

TOTALE PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO

- \* Dati influenzabili per cattivo posizionamento: +, \* Rapporto punteggio in riferimento all'età: anni 1 valore pieno del punteggio, anni 2 detrazione, anni 3 detrazione, anni 4 detrazione, anni 5 detrazione, \* Parametri che risentono di eventuale presenza di lassità: o, \* Parametri con espressione di effetti degenerativi di lassità: #

Punzonatura



**Ce.Le.Ma.Sche**

centrale di lettura delle malattie scheletriche del cane

VIA GIUSEPPE FABBRI 168 - 44124 FERRARA

TEL 0532.1858063

E-MAIL: segreteria@celemasche.it

WEB: http://www.celemasche.it

Formulario per la ricerca della displasia del gomito

N. ROI/RSR 18139687  
(o certificato equip.)

Data esecuzione 19/02/2024

**ANESTESIA**

Sedazione profonda e/o anestesia.....

Farmaco/i **MEDETOMIDINA - PROPOFOL**

Dosaggio per kg p.v. **0.05 mg/Kg - 4 mg/Kg**

**GIUDIZIO POSIZIONE RX M-L STANDARD**

Angolo omero-radio-ulnare <45° 45° >45°  

d	s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	d	s
---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Condili omerali sovrapposti sì no incerto  

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

**GIUDIZIO DELL'ESECUZIONE**

Ben leggibile Poco leggibile Incerta

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VALUTAZIONE DELL'ARTROSI**

Nessun segno di anomalità

Sclerosi ossea subtrocleare

lieve	evidente	grave
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osteofiti su bordo dorsale processo anconeale  
 » su bordo dorsale capitello radiale  
 » su epicondilo omerale laterale  
 » su epitroclea omerale mediale

<2 mm	tra 2 e 5 mm	>5 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VALUTAZIONE DELLE LESIONI PRIMARIE**

- Processo anconeale ulnare UAP = non unione processo anconeale
 

Norm.	UAP incompleta	UAP
d s	d s	d s
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Processo coronoideo mediale ulnare MCPD = Medial Coronoid Proces Disease o sospetta FCP FCP = Frammentazione Processo Coronoideo Mediale
 

Norm.	MCPD	FCP
d s	d s	d s
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Condilo omerale mediale KL = Kissing-Lesion OC/OCD = Osteo-Condrite/Dissecante
 

Norm.	KL	OC/OCD
d s	d s	d s
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rima articolare INC = Incongruenza
 

Norm.	INC <2mm	INC >2mm
d s	d s	d s
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verificata l'identità del cane

Giudizio del veterinario:

ED 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ED BL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ED 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ED 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ED 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**GIUDIZIO DELLA CENTRALE DI LETTURA**

ED 

0	BL	1	2	3
---	----	---	---	---

-----  
 Firma del lettore ufficiale Dr. Giuliano Pedrani



Grado 0: non si riscontrano alterazioni  
 Grado BL: (borderline, di transizione): alterazioni articolari minime  
 Grado 1: presenza di osteofiti di ampiezza <2mm, e/o di sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare <2mm  
 Grado 2: presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5 mm e/o di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare >2 mm; alterazioni del profilo del processo coronoideo mediale senza evidenza di frammentazione od una fusione incompleta del processo anconeale ulnare comportano comunque il grado 2  
 Grado 3: presenza di osteofiti di ampiezza >5 mm; l'evidenza di un processo coronoideo mediale frammentato o di una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteocondrite dissecante (OCD) o da erosione (KL), o di una mancata unione del processo anconeale (UAP) comportano comunque il grado 3. Anche i cani sottoposti ad interventi chirurgici per displasia del gomito devono essere classificati come Grado 3 indipendentemente dal grado delle alterazioni presenti, se l'intervento eseguito è dimostrabile radiograficamente.

Timbro e firma del Veterinario

**AMBULATORIO VETERINARIO**  
**Dott.ssa Gozzanelli Alice**  
 Via G. Di Vittorio, 40 - 44043 Qualieri (FE)  
 Cell. 349 617 8537 - Tel. 0522 828771  
 Iscr. MN725

OSSERVAZIONI DEL LETTORE UFFICIALE CELEMASCHE